

名稱：大鄧伯花
學名：Thunbergia grandiflora
Roxb
科別：爵床科
原產地：孟加拉

花期：6~12月 藍紫色 果期：8~12月

適性：抗污染性強 陽光需求強 水分需求中 肥料需求中

應用：庭園美化、圍籬美化，花廊，蔭棚

形態：常綠蔓性藤本，全株莖葉密被粗毛。葉對生，廣心型至闊卵形，葉緣角狀淺裂類似瓜葉；總狀花序，懸垂性；花冠藍紫色，喉部淺黃色。

製作者：詹世安



名稱：紫藤
別名：藤蘿、朱藤
科別：豆科紫藤屬
原產地：山東、河北、河南、
山西、陝西、浙江、湖北、
湖南、四川、廣東、甘肅

落葉大藤本，莖木質，單織鬆軟，幹皮灰白；奇數羽狀複葉，互生，小葉7~13枚，卵狀長橢圓形或卵狀披針形，先端突尖，基部廣楔形，長5—8釐米，全緣；花期4月，總狀花序，花紫色。紫藤對氣候和土壤的適應性很強，喜陽光，也略耐蔭，耐寒、耐旱，耐瘠。

製作者：詹世安



名稱：番茉莉
學名：Brunfelsia uniflora
(Pohi) D. Don
科別：美人襟科
原產地：熱帶巴西、委內瑞拉

葉：株葉互生，長橢圓形或倒卵形，兩端均銳，全緣。

花：4～8月開花，夏季為盛花期，花冠漏斗形，芳香（類似茉莉花香），單生於枝或葉腋；花冠初開時藍紫色，後變成白色，蒴果革質。

莖：高為80～220公分，小枝較短，枝條柔軟而開展。

用途：主要用在庭植及盆植。

製作者：詹世安



名稱：紫牡丹
學名：Melastoma candidum
科別：野牡丹科
原產地：中國南方及台灣

紫牡丹高約0.5-1.5公尺。莖略呈方形。嫩枝、葉及萼均密被淡褐色倒伏狀剛毛。葉對生，長橢圓形至卵狀橢圓形，全緣，長7~10公分。花紫紅色，3~7朵成聚繖花序，生於枝頂，萼筒壺狀，齒裂，裂片狹三角形，花瓣倒卵形，雄蕊10枚。果壺形，肉質，外被褐色毛。生性強，生長快速。

製作者：詹世安



名稱：紫牡丹

原產地：中國

介紹：

雄蕊五長五短，頂著鮮黃色花藥，長雄蕊還彎曲著。花謝之後，果實就包在壺形的萼筒裡。不開花時也很好辨認，它的葉有明顯的3~9條平行脈，葉面佈滿淡褐色密毛，摸起來有些刮手。夏季為主要花季。

作者：黃瓊慧



名稱：七里香

原產地：亞洲南部熱帶地區

介紹：

枝葉繁密是最常見的綠籬植物，葉子的象徵是以奇數羽狀複葉，倒卵形或卵形橢圓形。有濃厚的花香味道，花期在夏、秋季。花後會結果，果實卵形或是卵形橢圓形，果實初期為綠色熟後為紅色。

作者：黃瓊慧



名稱：細葉牡丹

原產地：中國、日本

介紹：

低矮灌木，分枝多；小枝細軟。葉紙質，橢圓至長橢圓形，長 0.7-1.8 cm，寬 0.4-0.6 cm，上表面光滑，下表面灰色，沿脈上被毛；葉柄被毛。花 2-5 朵成頂生繖形花序；雄蕊 7-10。 作者：黃瓊慧



名稱：迷你仙丹

原產地：東印度群島

介紹：

分枝多而細，葉小，生長緊密。花頂生，多花性，盛開時掩蔽原有枝葉，十分燦爛。耐旱、耐修剪，常剪成低矮的綠籬，或雕飾圖案成毛氈花壇來美化庭院。喜歡高溫，濕氣重的環境。

作者：黃瓊慧



名稱:蔓花生

原產地:熱帶亞洲、南美洲、
台灣馴化

鋪地蔓生。小葉兩對，夜會閉合。
四季青翠，春至秋均能開花，粗

生、又可限制其他雜草生長，花期長，也適吊盆懸垂栽植，甚為
殊雅，為優良植被植物

製作者：郭詩宇



名稱:使君子

原產地: 中國大陸
南部、印度、緬甸、
菲律賓、馬來半島、

使君子，根據藥書上記載為一中藥材，相傳有一位郭使君先生利用該植物的果實治病，具有相當療效，故後人稱之為使君子。【辨識特徵】
藤蔓植物，常用於綠廊，葉對生且質感似紙。

製作者：郭詩宇



名稱:炮仗紅

原產地: 巴西

常綠藤本植物，枝條可長達 20 公尺以上，有卷鬚，葉為奇數羽狀複葉，對生，光滑革質，全緣而尖頭，花序下垂而花朵呈微彎之長筒狀，圓錐花序，花冠裂片作鑷合狀排列，花橙紅色，上唇有 2 片，下唇為 3 片。

製作者：郭詩宇



名稱：蒜香藤

原產地：西印度，哥

倫比亞

蒜香藤因屬蔓性植物，栽培時需設立棚架，使其攀緣圍籬、牆垣生長。蔓莖枝條的長度，可達數尺以上，莖的表皮光滑，幼莖呈綠色，老莖呈褐色。每當花朵盛開時，密集的花朵成串。一般而言老株開花比新株開花多而密集。且花及葉都帶有蒜香味。

製作者：郭詩宇



名稱：龍眼

原產地：大陸華南

介紹：樹皮有細條裂狀剝落，看起來一副老態龍鍾樣。小葉數目多，8-12片。幾千朵小花聚集為頂生密錐花序，更能吸引昆蟲駐足為它們傳粉。花期4-5月，結果期約8-9月。果實甘甜，假種皮白色透明可食用。根、葉、假種皮(龍眼肉)及種子(龍眼核)可入藥。

製作者：賴婉瑜



名稱：桂花

原產地：中國大陸、日本、喜馬拉亞山

介紹：桂花別名銀桂、巖桂，屬木犀科長綠灌木或小喬木。常見的花色有金桂，銀桂，丹桂三種，是全年都能開花的植物，但以秋季是她最盛開的季節。每年中秋節來臨，也就是桂花飄香的季節，正應驗了「八月桂花香」這句話的由來。

作者：許麗純



名稱：紅粉撲花

原產地：蘇利南島、墨西哥至瓜地馬拉

介紹：紅粉撲花屬含羞草科之落葉灌木蜜源植物，花期夏至秋季，於五至七月開花，花姿十分可愛，花冠呈半圓型，頭狀花序，雄蕊色彩鮮艷，如長絲絨般，狀似粉撲，故而名之。

作者：許麗純



名稱：黃槐

原產地：印度、錫蘭及澳洲

介紹：黃槐屬蘇木科落葉小喬木。葉互生、偶數羽狀複葉，小葉 7~9 對，下部 2~3 對小葉間的葉軸上具有棍棒狀腺體，12~2 月落葉。小枝四稜形、花期長，幾乎全年開花。盛開時黃花鮮艷亮麗，綴滿全株。花腋生，總狀繖房花序，著生於枝端。莢果扁平、念珠狀，1~2 月成熟，種子黑褐色。

作者：許麗純



名稱：龍眼

原產地：大陸華南地區

介紹：龍眼別名牛眼、桂圓、福眼。屬無患子科；熱帶果樹；常綠喬木；偶數羽狀複葉，春季開圓錐花序；花小，密錐花序量多可達千朵或更多。龍眼是夏季的水果，春天開花結果，果實在夏末秋初成熟，可鮮食或製成龍眼乾，也是重要的中藥材。

作者：許麗純



名稱：山蘇

原產地：臺灣及東南亞一帶

介紹：

多年生大型著生植物，全省平地至海拔 1200 尺左右山區，均有它的蹤跡，常著生於陰濕的樹幹或岩石細縫上。葉片如海帶細長條形，葉形優美，可作為蔬菜調理，烹調時又不易變色，食用時香脆可口，無苦澀異味，在野菜餐館為一道可口上等美饌。

作者：林靜怡



名稱：蔓花生

原產地：熱帶亞洲、南美洲

介紹：

鋪地蔓生，小葉兩對，夜會閉合。四季青翠，春至秋均能開花，花期長也適吊盆懸垂栽植，甚為殊雅。由於蔓花生的根系發達，也可植於公路、邊坡等地防止水土流失，又不易滋生雜草與病蟲害，一般不用修剪，可有效節省人力及物力，是極有前途的優良地被植物。

作者：林靜怡




名稱：山茶花

原產地：日本、朝鮮、印度、中國長江及珠江流域的所有省區，尤以雲南省原產量最多

介紹：

常綠灌木或小喬木植物，高可達 15 公尺，莖平滑，灰白色。葉厚、葉緣有鋸齒，葉片革質，倒卵形至橢圓形。花色很多，多為重瓣，單瓣的少，花開時為半鐘狀或漏斗狀，花謝後，花瓣與雄蕊同時落下。花期從十一月開始開花，至次年的四月左右，種子可提煉茶油。

作者：林靜怡



名稱：楊桃

原產地：東南亞的馬來西亞

介紹：熱帶常綠果樹，性喜高溫，不喜寒冷，本鄉之丘陵地因氣候土壤適宜，適合楊桃之生長。楊桃一年四季均可開花結果，一般來說果實採收完畢，就是下一花期的開始，開花至結果約需四個月。果實生於老枝旁或落葉後葉腋，未熟時綠色或淡綠色，熟時黃綠色至鮮黃色。

作者：林靜怡



波蘿蜜 *Artocarpus heterophyllus* Jackfruit

原產地：印度西部

介紹：常綠喬木，株高可達 20 公尺以上。

【葉】互生，長橢圓形或倒卵形。

【花】單性聚合花，同株異花。

【果實】果為合生果，表皮有六角形龜狀突起，最大重量達 50 公斤，為世界之冠。果實肉色金

黃，富含香氣，食用風味特殊。

製作者：陳若如



油桐樹

原產地：中國大陸

學名：*Aluerrites fordii* Hemsli

花期：4~7 月

屬性：屬大戟科油桐屬，落葉小喬木，特徵：高可達十餘公尺，葉互生成卵形。開花時間在春夏之際，一朵朵白色的小花聚在一起生長，果實上有三個稜，表面佈滿皺紋；種子因含毒蛋白，誤食後會有嘔吐及休克現象。油桐樹生長快速，種子可以榨油或作為塗漆原料，木材可用來作家俱、木屐、牙籤、火柴棒，也可用來造紙。

製作者：陳若如



夜來香(*Cestrum nocturnum* L.)

學名：*Cestrum nocturnum* L.

科別：石蒜科

原產地：西印度

用途：盆栽、觀賞花卉

別名：夜丁香、夜香花、夜香玉

特性：1. 葉互生，單葉，披針狀長橢圓形，全緣。

2. 花小頂生或腋生，總狀花序，花色有青黃至奶油色，花瓣筒狀而先端5深瓣，有濃郁花香。

製作者：陳若如



野牡丹

科別：野牡丹科

學名：*Melastoma candidum*

別名：金牡丹, 埔筆仔

屬性：常綠小灌木

辨識特徵：

植株約 60~220cm 高，莖略成方形，小枝密被褐色剛毛，葉對生，橢圓形至卵形，全緣，葉脈 3~7 條表面粗糙，花頂生聚繖花序，徑約 7~8cm，紫紅或粉紅色，萼筒壺形，密生毛茸，花瓣五枚，果實為蒴果，包在宿存的萼筒中，徑約 1cm，種子極小。

製作者：陳若如